

MOXADIN
Oral soluble powder / Polvo soluble oral



Composition:

Amoxycillin (trihydrate) 0,495 g; Glucose 38,4 g; Sodium chloride 8,49 g; Citric acid 0,48 g; Potassium citrate 0,12 g; Monobasic potassium phosphate 4,02 g; Excipient to 100 g.

Indications and target species:

Bovine and swine.

Nutritive antibiotic and rehydrating product indicated to treat and prevent diarrhoeas in calves and pigs. Amoxycillin is a broad spectrum antibiotic active against Gram (+) and Gram (-) germs, which shows a good oral absorption and diffusion in the tissues. Its action is potentiated by electrolytes and energetic compounds which compensate the losses suffered by the ill animal.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water.

Administer 100 g (one sachet) of MOXADIN per each 1,5 litres of warm water, twice a day, for 2 days.

Withdrawal period:

Meat: 3 days.

Presentation:

Sachets of 100 g in containers of 3 kg.

Composición:

Amoxicilina (trihidrato) 0,495 g; Glucosa 38,4 g; Cloruro sódico 8,49 g; Ácido cítrico 0,48 g; Citrato potásico 0,12 g; Fosfato potásico monobásico 4,02 g; Excipiente c.s.p. 100 g.

Indicaciones y especies de destino:

Bovino y porcino.

Preparado antibiótico nutritivo y rehidratante indicado en el tratamiento y prevención de diarreas en terneros y cerdos. Amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro activo sobre microorganismos Gram (+) y Gram (-), el cual presenta buena absorción oral y buena difusión en los tejidos. Su acción viene potenciada por electrolitos y componentes energéticos que contribuyen a compensar las pérdidas que se producen en el animal enfermo.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida.

Administrar 100 g (1 sobre) de MOXADIN por cada 1,5 litros de agua templada, 2 veces al día, durante 2 días.

Período de supresión:

Carne: 3 días.

Presentación:

Sobres de 100 g en envases de 3 kg.